

問題	重要性
這種頭痛有多久了？	長時間持續多年且未曾改變的頭痛常為原發性頭痛，如偏頭痛。
頭痛是突發或慢慢發生？	原發性頭痛，包括不明原因 (idiopathic)、刺戳性(stabbing)頭痛、咳嗽或用力(exertion)引起的、和性交有關的、叢發性及叢發類(variant)，都可以快速發生。醫師對於數秒或數分鐘即痛到最痛者，可能會評估是否有潛在疾患如腦出血、栓塞、顱內壓上昇等情形。
何時頭痛發生？	睡眠時發生的頭痛可以是原發的。叢發性頭痛及偏頭痛都可在睡眠時發生或將人痛醒。然而，夜間頭痛亦可能是次發性，導因於某些引起顱內壓上昇的情形。有些時候，剛睡醒時也會有次發性頭痛。因為這些相似性，頭痛發生的時間需進一步探討來決定原發或次發。
是否曾經歷發燒、倦怠、體重減輕或全身不適？	這些症狀可能和潛在的感染、發炎或惡性腫瘤有關，可能有進一步檢查的必要
是否曾注意到下列神經學症狀：意識混亂、意識不清、麻木、無力、言語視力或平衡困難、或其他神經學不正常的症狀及徵象？	若你在偏頭痛發生前產生這些症狀，你可能符合預兆偏頭痛。然而，醫師必須區分不符合典型預兆偏頭痛的症狀及徵象，因此他或她會仔細的詢問相關病史看看是否這些症狀指向其他問題。
若你曾經歷過預兆，它是如何發生又持續多久？	偏頭痛預兆通常在數分鐘內逐漸產生，約在15至20分鐘達到頂峰後，約25分鐘消失。依定義，偏頭痛預兆小於一小時。若預兆超過一小時，醫師會更仔細地查看你的情形。
頭痛對你而言是新事件嗎？	原發性頭痛反反覆覆終其一生發作。新頭痛的發生，特別是超過50歲，則是個警訊。
若你已有多年頭痛，它改變了嗎？	醫師會想了解原本頭痛的改變，包括頻率、強度、時程等不同的特徵。